

**ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA**

<p style="text-align: center;">Imię i nazwisko pacjenta</p>	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">PESEL</p>										
<p style="text-align: center;">Oddział</p>	<p style="text-align: center;">data urodzenia</p>	<p style="text-align: center;">wzrost</p>	<p style="text-align: center;">waga</p>								

**INFORMACJA DLA PACJENTÓW:**

Znieczulenie wykonuje lekarz anestezjolog. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu i przeprowadzenie znieczulenia. Przed znieczuleniem jest zobowiązany do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej, zebrania wywiadu dotyczącego stanu ogólnego pacjenta, przebytych schorzeń. W czasie trwania znieczulenia dba o prawidłowe funkcjonowanie istotnych dla życia układów: krążenia i oddechowego.

**Znieczulenie ogólne:**

Znieczulenie ogólne, zwane popularnie narkozą, polega na uśpieniu, wyłączeniu bólu i niepożądanych odruchów u znieczulonego. Jeśli zabieg trwa krótko – kilka, kilkanaście minut, do znieczulenia ogólnego zwykle wystarcza podanie leków dożylnie. Do długich zabiegów, a także niekiedy do krótkich, konieczne jest zastosowanie intubacji tchawicy. Oznacza to założenie do tchawicy specjalnej rurki w celu zabezpieczenia dróg oddechowych pacjenta, umożliwia oddychanie oraz podawanie gazów znieczulających i tlenu. Przed założeniem rurki intubacyjnej pacjent otrzymuje dożylnie leki powodujące sen i zwióczenie mięśni, w celu bezbolesnego wykonania powyższej czynności. W trakcie zabiegu pacjent jest wentylowany tlenem, podawane są leki usypiające i przeciwbólowe tak, by stworzyć odpowiednie warunki do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

**Znieczulenie przewodowe (regionalne)**

Znieczulenie przewodowe polega na wyłączeniu czucia bólu w poszczególnych rejonach ciała poprzez podanie leku znieczulającego miejscowo w okolicy nerwów przewodzących ból z obszarów ciała, w obrębie których wykonywany jest zabieg. Znieczulenie przewodowe jest w większości przypadków sposobem znieczulenia, który w mniejszym stopniu obciąża organizm. Możliwe jest wykonanie wielu rodzajów znieczulenia przewodowego. Najczęściej wykonuje się znieczulenie podpajęczynówkowe, znieczulenie zewnątrzoponowe, blokadę splotu ramiennego, blokady poszczególnych nerwów. Znieczulenie podpajęczynówkowe i znieczulenie zewnątrzoponowe wykonuje się do zabiegów na kończynach dolnych, w obrębie krocza i dolnych partii brzucha. Znieczulenia te polegają na podaniu leku miejscowo znieczulającego w okolicę kręgosłupa. Ból związany z nakłuciem towarzyszącym każdemu znieczuleniu przewodowemu jest niewielki, gdyż igły używane do tego celu z reguły są bardzo cienkie, jeżeli do znieczulenia trzeba użyć grubszej igły, to miejsce nakłucia jest dodatkowo znieczulane miejscowo.

**Wybór sposobu znieczulenia**

Każdy ze sposobów znieczulenia ma zalety i wady. Lekarz anestezjolog zaproponuje Panu/Pani znieczulenie, które będzie najmniej obciążające organizm i najlepiej dostosowane do planowanego zabiegu.

**Ryzyko**

Powikłania związane ze znieczuleniem u pacjentów ze zdrowym układem krążenia i oddychania są niezmiernie rzadkie. Jednak każde postępowanie lekarskie wiąże się z określonym ryzykiem. Do możliwych, ale bardzo rzadkich powikłań znieczulenia ogólnego należy zachłyśnięcie treści pokarmową z następowym zachłystowym zapaleniem płuc (dlatego pacjent musi być na czczo), obrzęk krtani, upośledzenie oddychania w okresie bezpośrednio po znieczuleniu. W trakcie każdego rodzaju znieczulenia możliwe są zaburzenia funkcjonowania układu krążenia, dlatego też przed każdym znieczuleniem konieczne jest wkłucie do żyły cewnika, aby w każdej chwili można było podać potrzebne leki. W wyjątkowych przypadkach podczas intubacji może dojść do uszkodzenia uzębienia, śluzówki krtani, zaburzeń głosu (chrypka). W miejscu wstrzyknięcia może dojść do podrażnienia żyły. Po znieczuleniu mogą pojawić się bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, bóle mięśni. Ciężkie zagrażające życiu komplikacje podczas znieczulenia ogólnego (np. ustanie akcji serca) zdarzają się niezwykle rzadko. Nowoczesne metody leczenia, dokładne dozowanie środków znieczulających oraz stały monitoring funkcji życiowych minimalizuje takie ryzyko.

**Wskazówki dla pacjentów leczonych w szpitalu krócej niż 24 godziny:**

1. Powstrzymać się od jedzenia i picia na 6 godzin przed znieczuleniem
2. Zapewnić sobie opiekę osoby dorosłej przynajmniej 12 godzin przed opuszczeniem szpitala.
3. Powstrzymać się od prowadzenia jakichkolwiek pojazdów przez 24 godziny od znieczulenia.

## ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA cz 2

Wypełnia anestezjolog:

Rodzaj znieczulenia ..... Ryzyko ASA ..... BP, HR .....  
Premedykacja ..... Grupa krwi .....  
Odchylenia w badaniach laboratoryjnych, rtg, EKG, inne .....  
Ocena trudności w intubacji .....  
Inne problemy .....

Ankieta przedoperacyjna służy do zebrania informacji na podstawie których możliwe będzie wybranie najbardziej korzystnego sposobu postępowania anestezjologicznego. Pani/Pana współpraca przyczyni się do optymalnego przebiegu znieczulenia. Prosimy bardzo dokładnie odpowiedzieć na **podane na odwrocie pytania**. Wszystkie niejasności prosimy poruszyć podczas rozmowy z anestezjologiem i **w jego obecności podpisać zgodę na znieczulenie**.

### Proszę przeczytać poniższe pytania i zakreślić stosowną odpowiedź

Czy był Pan/Pani operowany(a)? Kiedy?.....	TAK	NIE	
Rodzaj zabiegu .....			
Czy dobrze zniósł/zniosła Pan/Pani znieczulenie?	TAK	NIE	NIE WIEM
Czy miał/a Pan/Pani transfuzję krwi? Kiedy?	TAK	NIE	NIE WIEM
Czy dobrze zniósł/zniosła Pan/Pani transfuzję?	TAK	NIE	NIE WIEM
Czy choruje lub chorował Pan/Pani na:			
- serce: zawał, choroba niedokrwienność, wada serca	TAK	NIE	NIE WIEM
- krążenie: nadciśnienie, niskie ciśnienie, omdlenia, duszności	TAK	NIE	NIE WIEM
- płuca: gruźlicę, rozedmę, pylicę, astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli	TAK	NIE	NIE WIEM
- żołądek: choroba wrzodowa, zapalenie	TAK	NIE	NIE WIEM
- wątrobę: żółtaczkę, stłuszczenie, marskość	TAK	NIE	NIE WIEM
- układ moczowy: zapalenie nerek, kamica, trudności w oddawaniu moczu	TAK	NIE	NIE WIEM
- cukrzycę, dnę moczanową porfirię	TAK	NIE	NIE WIEM
- tarczycę: wole obojętne, nadczynność, niedoczynność	TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby oczu: jaskra, zaćma	TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby nerwów: porażenie drgawki, padaczka, udar	TAK	NIE	NIE WIEM
- zmiany nastroju: depresja, nerwica	TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby kręgosłupa, zmiany w stawach, osłabienie mięśni	TAK	NIE	NIE WIEM
- choroby krwi: skłonność do krwawień, siniaków	TAK	NIE	NIE WIEM
- uczulenia: leki, plaster, katar sienny, inne	TAK	NIE	NIE WIEM
Czy pije Pan/Pani alkohol?	TAK	NIE	
Czy jest Pan/Pani w ciąży?	TAK	NIE	NIE WIEM
Protezy zębowe wyjmowane	TAK	NIE	
Szklą kontaktowe, proteza oka	TAK	NIE	
Czy Pan/Pani pali? Jeśli tak, to ile?	TAK	NIE	
Czy używa Pan/Pani środki nasenne? Jeśli tak to jakie?	TAK	NIE	
Inne schorzenia .....			
Jakie leki przyjmuje Pan/Pani obecnie .....			

### Oświadczenie pacjenta i zgoda na znieczulenie

Lekarz ..... przeprowadził ze mną rozmowę wyjaśniającą problem znieczulenia do operacji. Podczas tej rozmowy mogłem/am zapytać o wszystkie interesujące mnie problemy dotyczące rodzaju znieczulenia, związanego z nim ryzyka oraz okoliczności, które mogą wystąpić przed i po operacji. Rozumiem na czym będzie polegać znieczulenie. **Nie mam więcej pytań.**

**Proszę o wykonanie u mnie znieczulenia ogólnego / regionalnego do zabiegu operacyjnego.** Zgadzam się na towarzyszące zabiegowi postępowanie, tj. infuzje płynów, transfuzje krwi własnej i obcej, niezbędne leki podawane w czasie i po zabiegu. Zgadzam się na uzasadnione medyczne zmiany lub rozszerzenie postępowania anestezjologicznego, w tym zmianę rodzaju i zakres znieczulenia.

Uwagi pacjenta .....

.....  
data ..... czytelny podpis pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego ..... podpis lekarza .....