

KARTA PRZYGOTOWANIA DO ZABIEGU FESS

BADANIA LABORATORYJNE KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ:

7 – 14 dni przed planowanym zabiegiem

- Grupa krwi
- Morfologia
- Układ krzepnięcia
- Jonogram

DATA PLANOWANEGO
ZABIEGU:

Kwalifikacja anestezyjologiczna do zabiegu odbywa się najczęściej w dniu zabiegu.

JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZABIEGU FESS?

- Proszę zgłosić się na wizytę miesiąc przed planowanym zabiegiem.
- Zgodnie z zaleceniami lekarza proszę przyjmować kortykosteroidy doustne 7-21 dni przed planowanym zabiegiem.
- Przez CAŁY okres oczekiwania na zabieg należy stosować steroidoterapię donosową (Aerozol / Krople)

W CELU USTALENIA SZCZEGÓŁÓW DOTYCZĄCYCH CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM ZABIEGU PROSZĘ O KONTAKT Z KOORDYNATOREM SZPITALA:

Grażyna Kaflińska -Bobek **603 158 590**

Drogi pacjencie,

FUNKCJONALNA ENDOSKOPOWA CHIRURGIA ZATOK PRZYNOSOWYCH (FESS)

Wskazana jest w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych. Polega na usunięciu z nosa, z komórek sitowych, zatok szczękowych, czołowych i klinowych polipów, tkanek zapalnych, nieprawidłowych przegród kostnych, odblokowaniu ujść naturalnych zatok, wypłukaniu zatok i usunięciu patologicznej wydzieliny (ropy, mas grzybiczych, treści zastoinowej). Można jednocześnie wykonać wyprostowanie przegrody nosa i zmniejszyć małżowiny nosowe dolne (o ile jest to konieczne). Wykonywany jest zawsze w znieczuleniu ogólnym.

UWAGA: zabieg przywraca drożność nosa, poprawia wentylację zatok przynosowych i węch (o ile brak węchu nie trwał latami), pozwala na złagodzenie zatoko-pochodnych bólów głowy, ale nie zabezpiecza przed odrostem polipów w przypadku alergii, nie jest też skuteczny w przypadku przewlekłego ściekania wydzieliny po tylnej ścianie gardła.

Jest zabiegiem wieloetapowym i złożonym, zakres zabiegu zależy od rozległości zmian; nie wszystkie etapy muszą być wykonywane w Pana/Pani przypadku.

- Usunięcie wyrostka haczykowatego
- Poszerzenie ujścia zatoki szczękowej
- Otwarcie sitowia przedniego i zachyłka czołowego
- Otwarcie sitowia tylnego
- Otwarcie zatoki klinowej

Przy zaniechaniu leczenia możliwe jest pogorszenie stanu zdrowia. Nie ma alternatywnej metody leczenia.

Ze wszystkimi wątpliwościami i pytaniami proszę zgłaszać się bezpośrednio do lekarza

prowadzącego:

Dr Przemysław Stachowiak: 607 604 703